arXiv:math/0702512v1 [math.GR] 17 Feb 2007

CENTRALISATEURS DANS UN GROUPE CRISTALLOGRAPHIQUE 2-DIMENSIONNEL

Jean-Philippe PRÉAUX[1 2]

Résumé. Nous explicitons les centralisateurs dans un groupe discret cocompact d'isométrie du plan euclidien.

Introduction

Nous donnons de façon explicite les centralisateurs dans un groupe cristallographique 2-dimensionnel (ou encore : sous-groupes discrets cocompacts d'isométrie de $\mathbb{E}^2$, ou π_1^{orb} d'orbiétés euclidiennes).

1. Rappels sur les groupes Fuchsiens

Soit Γ un groupe discret cocompact d'isométrie de $\mathbb{E}^2$, $\mathbb{H}^2$ ou $\mathbb{S}^2$. Il est connu que Γ admet une des deux présentations suivantes où $p, q, g, \alpha_j \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha_j > 1$.
Si Γ préserve l'orientation :

$$< a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g, c_1, \ldots, c_q, d_1, \ldots, d_p \mid c_j^{\alpha_j} = 1,\ (\prod_{i=1}^{g}[a_i, b_i])c_1 \cdots c_q d_1 \cdots d_p = 1 >$$

Si Γ renverse l'orientation :

$$< a_1, \ldots, a_g, c_1, \ldots, c_q, d_1, \ldots, d_p \mid c_j^{\alpha_j} = 1,\ a_1^2 \cdots a_g^2 c_1 \cdots c_q d_1 \cdots d_p = 1 >$$

Ces groupes, parfois appelés groupes Fuchsiens ou encore planaires, sont bien connus des analystes complexes, des géomètres et des topologues, et largement étudiés. Aussi, pour une introduction aux groupes Fuchsiens au sens où nous l'entendons nous renvoyons le lecteur aux ouvrages de référence [JS], [He] et [LS]. Nous rappelerons les résultats qui nous serons utiles dans la suite.

Topologiquement, le groupe Fuchsien Γ préservant (resp. renversant) l'orientation, est le groupe fondamental de l'espace topologique K que l'on obtient en retirant q disques disjoints sur la surface B orientable (resp. non orientable) de genre g, et en recollant sur les q composantes au bord de la surface obtenue, des disques, par des applications de degrés respectifs $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_q$.

Dans le cas où B est à bord non vide, la dernière relation peut être transformée en

$$d_j^{-1} = d_{j+1} \cdots d_p.(\prod_{i=1}^{g}[a_i, b_i]).c_1 \cdots c_q d_1 \cdots d_{j-1}$$

[1]Centre de recherche de l'Armée de l'Air, Ecole de l'air, F-13661 Salon de Provence air
[2]Centre de Mathématiques et d'informatique, Université de Provence, 39 rue F.Joliot-Curie, F-13453 marseille cedex 13
E-mail : preaux@cmi.univ-mrs.fr
Mathematical subject classification : 20H10, 20H15, 20E99

ou

$$d_j^{-1} = d_{j+1} \cdots d_p.(\prod_{i=1}^{g} a_i^2).c_1 \cdots c_q d_1 \cdots d_{j-1}$$

pour tout $j = 1 \cdots n$. Un changement de Tietze permet alors de supprimer cette relation et le générateur d_j. Ainsi Γ est le produit libre des groupes cycliques engendrés par les générateurs a_i, b_j(dans le cas orientable), c_k, et d_l, à l'exception de l'un quelconque des d_l.

Il est bien connu qu'un produit libre de groupes cycliques contient un sous-groupe libre d'indice fini. En particulier, si $\partial B \neq \varnothing$, alors Γ contient le groupe d'une surface à bord non vide, comme sous-groupe d'indice fini. Ce résultat reste vrai dans le cas où la surface B est fermée comme l'établit le théorème suivant (théorème 12.2, [He]).

Théorème 1.1 (Sous-groupe de surface d'indice fini)**.** *Soit* Γ *un groupe discret cocompact d'isométrie de* $\mathbb{E}^2$, $\mathbb{H}^2$ *ou* $\mathbb{S}^2$. *Si* Γ *admet pour présentation :*

$$< a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g, c_1, \ldots, c_q \mid c_j^{\alpha_j} = 1,\ (\prod_{i=1}^{g}[a_i, b_i])c_1 \cdots c_q = 1 > \qquad (1)$$

ou

$$< a_1, \ldots, a_g, c_1, \ldots, c_q \mid c_j^{\alpha_j} = 1,\ a_1^2 \cdots a_g^2 c_1 \cdots c_q = 1 > \qquad (2)$$

alors, Γ *contient le groupe d'une surface fermée* F*, comme sous-groupe d'indice fini,* l*. De plus la caractéristique d'Euler de* F*, est donnée par la formule suivante :*

$$\chi(F) = \begin{cases} l(2 - 2g - \sum_{i=1}^{q}(1 - \frac{1}{\alpha_i})) & \text{dans le cas (1)} \\ l(2 - g - \sum_{i=1}^{q}(1 - \frac{1}{\alpha_i})) & \text{dans le cas (2)} \end{cases}$$

En particulier, $\chi(F) > 0$ *ssi,*
Cas (1) : $g = 0$, *et soit* $q \leq 2$ *soit* $q = 3$ *et* $1/\alpha_1 + 1/\alpha_2 + 1/\alpha_3 > 1$.
Cas (2) : $g = 1$, $q = 1$ *et* $\alpha_1 = 2$ *ou* $g = 0$ *et soit* $q \leq 2$ *soit* $q = 3$ *et* $1/\alpha_1 + 1/\alpha_2 + 1/\alpha_3 > 1$.
et $\chi(F) = 0$ *seulement dans les cas suivants :*
Cas (1) : $g = 1$ *et* $q = 0$ *; ou* $g = 0$, $q = 3$, *d'indices* $(3, 3, 3), (2, 4, 4)$ *ou* $(2, 3, 6)$ *; ou* $g = 0$, $q = 4$, *d'indices* $(2, 2, 2, 2)$.
Cas (2) : $g = 2$ *et* $q = 0$ *; ou* $g = 1$, $q = 2$, *d'indices* $(2, 2)$.

Remarque 1 : Si $\chi(F) \leq 0$, alors Γ est infini. Ainsi, si B est fermée, Γ est fini ssi $\chi(F) > 0$. Si $\partial B \neq 0$, alors Γ est cyclique fini lorsque $g = 0$, $q \geq 1$ et $p = 1$, et infini sinon.

Remarque 2 : Les groupes finis obtenues (sous-groupes discrets d'isométrie de S^2, ou encore sous-groupes finis de $O(3)$) sont :
– $g = 0$ et $q \leq 2$, Γ est cyclique fini.
– $g = 0$ et $q = 3$, d'indices :
  – $(2, 2, n)$; Γ est le groupe diédral D_{2n}.
  – $(2, 3, 3)$; Γ est le groupe tétraédral A_4.
  – $(2, 3, 4)$; Γ est le groupe octaédral S_4.
  – $(2, 3, 5)$; Γ est le groupe icosaédral A_5.
– $g = 1$, $q = 1$, $\alpha_1 = 2$ et Γ renverse l'orientation : $\Gamma \cong \mathbb{Z}_4$.

Dans un sens, un groupe Fuchsien est un "groupe de surface avec torsion". Le théorème suivant établit que si Γ est infini les seuls éléments de torsion sont à conjugaison près les c_i. C'est la proposition 6.2 de [LS], ou sous une forme plus réduite la proposition II.3.6 de [JS].

Théorème 1.2 (Torsion dans un groupe Fuchsien infini)**.** *Soit* Γ, *donné par une des présentations (1) ou (2) figurant plus haut. Si* Γ *est infini, alors tout élément* u *non trivial, de torsion, est dans un conjugué d'un des sous-groupes* $< c_j >$, *pour* $j = 1, \ldots, q$. *De plus*

il s'écrit de façon unique sous la forme $u = vc_j^n v^{-1}$*, avec* $0 < n < \alpha_j$, i.e., *si il s'écrit aussi* $u = wc_k^m w^{-1}$*, avec* $0 < m < \alpha_k$*, alors* $j = k$*,* $n = m$*, et* $w = vc_j^t$*, pour* $t \in \mathbb{Z}$*.*

2. Centralisateurs des groupes Fuchsiens infinis

Notons $\overline{B}$ la surface obtenue en retirant q disques disjoints sur B. Si la surface B est non orientable, il en va de même de la surface $\overline{B}$. Considérons le revêtement d'orientation de $\overline{B}$. Puisque tout lacet de $\partial\overline{B}$ préserve l'orientation, ce revêtement s'étend à un revêtement à deux feuillets $\widetilde{K}$ de K. Le groupe $\pi_1(\widetilde{K})$ s'injecte dans $\pi_1(K) = \Gamma$, nous noterons $\overline{\Gamma}$ son image. C'est un sous-groupe d'indice 2 dans Γ.

Ce sous-groupe $\overline{\Gamma}$ peut aussi se définir combinatoirement. Supposons encore que la surface B soit non orientable, et considérons la présentation (2) de Γ donnée auparavant. Un élément g de Γ sera dit A-pair, si un mot le représentant contient un nombre pair d'occurences de lettres $a_1, a_1^{-1}, \ldots, a_g, a_g^{-1}$. Puisque les relateurs de Γ contiennent un nombre pair d'occurences de telles lettres, cette notion est bien définie. Notons $\overline{\Gamma}$ le sous-ensemble de Γ constitué des éléments A-pairs ; il est facile de vérifier que Π est un sous-groupe d'indice 2 de Γ. On retrouve la définition précédente : pour voir celà, il suffit de remarquer que parmi les générateurs de Γ (donnés par la présentation (2)), seuls les a_i ont pour représentants des lacets qui renversent l'orientation de K. Si B est orientable, on pose $\overline{\Gamma} = \Gamma$.

Nous disposons maintenant du vocabulaire nécessaire pour énoncer le résultat caractérisant le centralisateur d'un élément dans un groupe Fuchsien infini.

Théorème 2.1 (Centralisateurs dans un groupe Fuchsien infini)**.** *Soit* Γ *un groupe Fuchsien infini, et* u *un élément non trivial de* Γ*. Si* u *est d'ordre infini, alors son centralisateur* $\mathcal{Z}(u)$ *est soit isomorphe au groupe de la bouteille de klein, soit libre abélien de rang* 1 *ou* 2*. Si de plus* $u \notin \overline{\Gamma}$*, alors* $\mathcal{Z}(u)$ *est cyclique infini.*

Si u *est d'ordre fini, alors son centralisateur est cyclique fini. Plus précisément (cf. proposition 1.2), pour* $i = 1, \ldots, q$*, et* $0 < n < \alpha_i$*,* $\mathcal{Z}(c_i^n) =< c_i >$*.*

Remarque : Si Γ est fini, le centralisateur d'un élément n'est pas nécessairement cyclique. Ainsi par exemple si $B = S^2$, $q = 3$ d'indices $(2, 2, 2)$, $\Gamma \cong \mathbb{Z}_2 \times Z_2$ est abélien non cyclique, et Γ est le centralisateur de chacun de ses éléments.

Démonstration Notons $\overline{\Gamma}$ le sous-groupe canonique de Γ. Considérons le centralisateur $\mathcal{Z}(u)$ d'un élément u de Γ.

Si u est d'ordre infini $\mathcal{Z}(u)$ est un groupe infini ayant un centre non trivial. Maintenant, d'une part tout sous-groupe d'un groupe Fuchsien est un groupe Fuchsien (cf. §3 de [JS]), et ainsi $\mathcal{Z}(u)$ est un groupe Fuchsien. D'autre part, un groupe Fuchsien infini ayant un centre non trivial est soit le groupe de la bouteille de Klein, soit libre abélien de rang 1 ou 2. Si son centre n'est pas contenu dans le sous-groupe canonique $\mathcal{Z}(u) \cap \overline{\Gamma}$ de $\mathcal{Z}(u)$ alors G est cyclique infini (cf. proposition II.3.11, [JS]). Ainsi si $u \notin \overline{\Gamma}$ alors $\mathcal{Z}(u)$ est cyclique infini. Ceci démontre la première partie de la proposition.

Si u est d'ordre fini, alors $\mathcal{Z}(u)$ ne peut pas contenir d'élément d'ordre infini. En effet, dans le cas contraire $\mathcal{Z}(u)$ contiendrait le sous-groupe $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n$, qui n'est pas un groupe Fuchsien (lemme II.3.10 [JS]), ce qui est contradictoire. Avec le théorème 1.2, si u est d'ordre fini, u est conjugué à c_i^n, pour $1 \leq i \leq q$ et $n \in \mathbb{Z}_*$, et nous supposerons sans perte de généralité que $u = c_i^n$. Considérons un élément non trivial $v \in \mathcal{Z}(u)$, il est de torsion, et donc avec le théorème 1.2, $v = ac_j^m a^{-1}$. Puisque u et v commutent, $u = c_i^n = ac_j^m a^{-1} c_i^n ac_j^{-m} a^{-1}$ et donc avec le théorème 1.2 il existe $k \neq 0$, $v = ac_j^m a^{-1} = c_i^k$ et donc $v \in< c_i >$. Ainsi, pour $n \neq 0$, $\mathcal{Z}(c_i^n) =< c_i >$. □

Soit Γ un groupe discret cocompact d'isométrie de $\mathbb{E}^2$ ou $\mathbb{H}^2$. Soit Γ contient $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ soit Γ est un sous-groupe discret de $PSL(2,\mathbb{R}) = Isom^+(\mathbb{H}^2)$. Dans le dernier cas, Γ est soit produit libre de groupes cycliques soit sans torsion, et dans tous les cas hyperbolique au sens de Gromov. Le centralisateur d'un élément est cyclique, et l'on peut algorithmiquement le déterminer pour un élément arbitraire en appliquant l'algorithme figurant en [Pr2].

Les cas restant correspondent au cas euclidien, ou encore à B fermée, et Γ contenant un sous-groupe d'indice fini, isomorphe au groupe d'une surface F avec $\chi(F) = 0$. Il existe 7 groupes Fuchsiens vérifiant ces conditions, ils sont caractérisés dans le théorème 1.1. Dans ce cas, Γ contient $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ comme sous-groupe d'indice fini et le centralisateur d'un élément n'est plus nécessairement cyclique. Le lemme suivant fournit une présentation plus adéquate pour chacun de ces groupes, en ceci qu'elle explicite le sous-groupe libre abélien de rang 2 d'indice fini, et une décomposition en un produit semi-direct d'un groupe de surface euclidienne par un groupe fini.

Lemme 2.1 (Présentation pour un groupe Fuchsien cristallographique)**.** *Considérons les groupes Fuchsiens suivants :*

$$G_1 =< a_1, a_2 \mid a_1^2 a_2^2 = 1 >$$
$$G_2 =< c_1, c_2, c_3 \mid c_1^2 = c_2^2 = c_3^2 = (c_1c_2c_3)^2 = 1 >$$
$$G_3 =< c_1, c_2 \mid c_1^3 = c_2^3 = (c_1c_2)^3 = 1 >$$
$$G_4 =< c_1, c_2, \mid c_1^4 = c_2^4 = (c_1c_2)^2 = 1 >$$
$$G_5 =< c_1, c_2, \mid c_1^6 = c_2^3 = (c_1c_2)^2 = 1 >$$
$$G_6 =< a, c, \mid c^2 = (a^2c)^2 = 1 >$$

Ils admettent aussi pour présentations :

$$G_1 \cong < a, t_1, t_2 \mid a^2 = t_1,\ [t_1, t_2] = 1,\ at_2a^{-1} = t_2^{-1} >$$
$$G_2 \cong < c, t_1, t_2 \mid c^2 = 1,\ [t_1, t_2] = 1,\ ct_1c^{-1} = t_1^{-1},\ ct_2c^{-1} = t_2^{-1} >$$
$$G_3 \cong < c, t_1, t_2 \mid c^3 = 1,\ [t_1, t_2] = 1,\ ct_1c^{-1} = t_2,\ ct_2c^{-1} = t_1^{-1}t_2^{-1} >$$
$$G_4 \cong < c, t_1, t_2 \mid c^4 = 1,\ [t_1, t_2] = 1,\ ct_1c^{-1} = t_2,\ ct_2c^{-1} = t_1^{-1} >$$
$$G_5 \cong < c, t_1, t_2 \mid c^6 = 1,\ [t_1, t_2] = 1,\ ct_1c^{-1} = t_2,\ ct_2c^{-1} = t_1^{-1}t_2 >$$
$$G_6 \cong < a, c, t_1, t_2 \mid\ a^2 = t_1,\ [t_1, t_2] = 1,\ at_2a^{-1} = t_2^{-1},$$
$$c^2 = 1, ct_1c^{-1} = t_1^{-1},\ ct_2c^{-1} = t_2^{-1}, c\,a\,c^{-1} = t_2a^{-1} >$$

Remarques : – Les présentations obtenues explicitent le sous-groupe $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ d'indice fini et la structure de produit semi-direct pour chacun de ces groupes.

– Bien sûr G_1 est le groupe de la bouteille de Klein, G_2, G_3, G_4, G_5 sont des produits semi-directs de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, respectivement par $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$, $\mathbb{Z}_6$. Quant à G_6, c'est un produit semi-direct du groupe de la bouteille de Klein par $\mathbb{Z}_2$ mais aussi une extension finie de $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ par $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$.

– Les sous-groupes d'orientation $\overline{G}_1, \overline{G}_6$ de G_1 et G_6 sont engendrés respectivement par a^2, t_1, t_2 et a^2, c, t_1, t_2.

Démonstration. Procéder par changements de Tietze. Nous n'indiquons que comment exprimer les nouveaux générateurs en fonction des anciens.
Pour G_1. Poser $a = a_1$, $t_1 = a_1^2$, et $t_2 = a_1^{-1}a_2^{-1}$.
Pour G_2. Posons $c = c_1$, $t_1 = c_2c_1$, et $t_2 = c_2c_3$.
Pour G_3. Posons $c = c_1^{-1}$, $t_1 = c_1^{-1}c_2$, et $t_2 = c_1c_2c_1$.
Pour G_4. Posons $c = c_1$, $t_1 = c_2c_1^{-1}$, et $t_2 = c_1c_2c_1^2$.

Pour G_5. Posons $c = c_1$, $t_1 = c_1^{-2}c_2$, et $t_2 = c_1^{-1}c_2c_1^{-1}$.
Pour G_6. Posons $t_1 = a^2$, et $t_2 = (ca)^2$. □

Nous pouvons dès-lors expliciter les centralisateurs dans ces groupes. Une preuve calculatoire peut se trouver dans ma thèse de doctorat ([Pr1]).

Théorème 2.2 (Centralisateurs des groupes Fuchsiens cristallographiques)**.** *Considérons les groupes G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 et G_6 apparaissant dans le lemme 2.1, et munissons-les des présentations qu'il nous fournit. Elles explicitent pour chacun des G_i un sous-groupe d'indice fini, libre abélien de rang 2, engendré par t_1, t_2 ; notons le H_i. Nous décrivons le centralisateur d'un élément quelconque de ces groupes. Si $u \in G_i$, notons $\mathcal{Z}(u)$ son centralisateur dans G_i.*

<u>Pour G_1</u> : Tout élément de G_1 s'écrit de façon unique, sous la forme $t_1^{n_1}t_2^{n_2}$ ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}a$. Le centralisateur d'un élément non trivial $u \in G_1$, est décrit par :

$u \in H_1$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} G_1 \cong \pi_1(\mathbb{KB}_2) & si\ u \in < t_1 > \\ H_1 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & si\ u \notin < t_1 > \end{cases}$
$u \in H_1.a$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}a$	$\mathcal{Z}(u) = < t_2^{n_2}a >$

<u>Pour G_2</u> : Tout élément de G_2 s'écrit de façon unique sous la forme $t_1^{n_1}t_2^{n_2}$ ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$. Le centralisateur d'un élément non trivial u de G_2 est décrit par :

$u \in H_2$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = H_2 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$
$u \in H_2.c$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$	$\mathcal{Z}(u) = < u >$

<u>Pour G_3</u> : Tout élément de G_3 s'écrit de façon unique sous la forme $t_1^{n_1}t_2^{n_2}$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^2$. Le centralisateur d'un élément non trivial u de G_3 est décrit par :

$u \in H_3$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = H_3 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$
$u \in H_3.c$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$	$\mathcal{Z}(u) = < u >$
$u \in H_3.c^2$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^2$	$\mathcal{Z}(u) = < t_1^{n_2}t_2^{n_2-n_1}c >$

<u>Pour G_4</u> : Tout élément de G_4 s'écrit de façon unique sous la forme $t_1^{n_1}t_2^{n_2}$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^2$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^3$. Le centralisateur d'un élément non trivial u de G_4 est décrit par :

$u \in H_4$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = H_4 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$
$u \in H_4.c$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$	$\mathcal{Z}(u) = < u >$
$u \in H_4.c^2$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^2$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} < t_1^{\frac{n_1+n_2}{2}} t_2^{\frac{n_2-n_1}{2}} c > & si\ n_1 + n_2\ pair \\ < u > & sinon \end{cases}$
$u \in H_4.c^3$ $u = t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^3$	$\mathcal{Z}(u) = < t_1^{n_2}t_2^{-n_1}c >$

<u>Pour G_5</u> : Tout élément de G_5 s'écrit de façon unique sous la forme $t_1^{n_1}t_2^{n_2}$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^2$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^3$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^4$, ou $t_1^{n_1}t_2^{n_2}c^5$. Le centralisateur d'un élément non trivial u de G_5 est décrit par :

$u \in H_5$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = H_5 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$
$u \in H_5.c$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c$	$\mathcal{Z}(u) = < u >$
$u \in H_5.c^2$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c^2$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} < t_1^{\frac{2n_1+n_2}{3}} t_2^{\frac{n_2-n_1}{3}} c > & si\ 3/(n_1 - n_2) \\ < u > & sinon \end{cases}$
$u \in H_5.c^3$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c^3$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} < t_1^{\frac{n_1+n_2}{2}} t_2^{-\frac{n_1}{2}} c > & si\ n_1\ et\ n_2\ pairs \\ < u > & sinon \end{cases}$
$u \in H_5.c^4$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c^4$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} < t_1^{\frac{n_1+2n_2}{3}} t_2^{-\frac{2n_1+n_2}{3}} c > & si\ 3/(n_1 - n_2) \\ < t_1^{n_1+n_2} t_2^{-n_1} c^2 > & sinon \end{cases}$
$u \in H_5.c^5$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c^5$	$\mathcal{Z}(u) = < t_1^{n_2} t_2^{-(n_1+n_2)} c >$

Pour G_6 : *Tout élément de G_6 s'écrit uniquement sous la forme $t_1^{n_1} t_2^{n_2}$ ou $t_1^{n_1} t_2^{n_2} a$, ou $t_1^{n_1} t_2^{n_2} c$, ou $t_1^{n_1} t_2^{n_2} a\, c$. Notons K_6 le sous-groupe de G_6 engendré par a, t_1, t_2 ; il est isomorphe au groupe de la bouteille de Klein. Le centralisateur d'un élément non trivial u de G_6 est décrit par :*

$u \in H_6$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2}$	$\mathcal{Z}(u) = \begin{cases} < ac\, , t_1 > \cong \pi_1(\mathbb{KB}_2) & si\ u \in < t_2 > \\ K_6 \cong \pi_1(\mathbb{KB}_2) & si\ u \in < t_1 > \\ H_6 \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} & sinon \end{cases}$
$u \in H_6.a$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} a$	$\mathcal{Z}(u) = < t_2^{n_2} a >$
$u \in H_6.c$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} c$	$\mathcal{Z}(u) = < u >$
$u \in H_6.ac$ $u = t_1^{n_1} t_2^{n_2} ac$	$\mathcal{Z}(u) = < t_1^{n_1} ac >$

Corollaire 2.1. *Sous les mêmes hypothèses que précédemment, G_1 a un centre cyclique infini engendré par t_1, tandis que G_2, G_3, G_4, G_5, G_6 ont un centre trivial.*

Références

[He] J.Hempel, *3-manifolds*, Annals of mathematics studies, Priceton university press, 1976.

[JS] W.Jaco and P. Shalen, *Seifert fibre space in 3-manifolds*, Memoirs of the Amer. Math. Society **220** (1979).

[LS] R.Lyndon and P.Schupp, *Combinatorial group theory*, Springer Verlag, 1976.

[Pr1] J.P.Préaux, *Problème de conjugaison dans le groupe d'une 3-variété orientée vérifiant l'hypothèse de géométrisation de Thurston*, Thèse de doctorat (2001), disponible sur `http ://www.cmi.univ-mrs.fr/~preaux` .

[Pr2] J.P.Préaux, *Solutions à divers problèmes de décision dans un groupe hyperbolique*, ArXiV math.GR/0702117.